

## 附錄 1-2 疼痛程度評估及止痛計畫表

### 一、實驗鼠與兔止痛計畫

依據附錄 1-1，5 種評估項目進行疼痛程度給分

項目	正常	輕微疼痛	中度疼痛	重度疼痛
疼痛程度給分	0 分	1 分	2 分	4 分
分數加總 止痛計畫	0-4 無	5-9 提供止痛藥品， 每 24 小時重新評 估動物狀態	10-14 提供止痛藥品，每 8-12 小時重新評 估動物狀態。連續 3 次此區分數，考 慮給予安樂死。	15-20 提供止痛藥品，若 4 小時內無法緩 解動物疼痛，考慮 給予安樂死。

註：若單一項目達 4 分，應立即啟動止痛計畫。

### 止痛藥品使用(對應更新的疼痛分類表)

#### 1.小鼠

輕度疼痛或緊迫 (對應疼痛等級D1)	中度疼痛或緊迫 (對應疼痛等級D1、D2)	重度疼痛或緊迫 (對應疼痛等級D2、E)
局部麻醉劑 Lidocaine	局部麻醉劑 Lidocaine/ Bupivacaine (與全身性止痛合併使用)	局部麻醉劑 Lidocaine/ Bupivacaine (與全身性止痛合併使用)
Butorphanol 1–2 mg/kg, SC, once	Buprenorphine 0.05–0.1 mg/kg, SC, q 8–12 h	Buprenorphine* 0.05–0.1 mg/kg, SC, q 8–12 h
Ketoprofen 2–5 mg/kg, SC, once	Ketoprofen 2–5 mg/kg, SC, q 24 h	Ketoprofen# 2–5 mg/kg, SC, q 24 h
		Morphine 2–5 mg/kg, SC, q 2–4 h

#### 2.大鼠

輕度疼痛或緊迫 (對應疼痛等級D1)	中度疼痛或緊迫 (對應疼痛等級D1、D2)	重度疼痛或緊迫 (對應疼痛等級D2、E)
局部麻醉劑 Lidocaine/ Bupivacaine (與全身性止痛合併使用)	局部麻醉劑 Lidocaine/ Bupivacaine (與全身性止痛合併使用)	局部麻醉劑 Lidocaine/ Bupivacaine (與全身性止痛合併使用)
Butorphanol 2 mg/kg, SC, once	Buprenorphine 0.05 mg/kg, SC, q 6–12 h	Buprenorphine* 0.05 mg/kg, SC, q 6–8 h
Ketoprofen	Ketoprofen	Ketoprofen#

$\leq 3 \text{ mg/kg}$ , SC, once	$\leq 3 \text{ mg/kg}$ , SC, q 24 h	$\leq 3 \text{ mg/kg}$ , SC, q 24 h
Meloxicam 1 mg/kg, SC, once	Meloxicam 1–2 mg/kg, SC, q 24 h	Meloxicam# 1–2 mg/kg, SC, q 24 h
		Morphine 2.5–10 mg/kg, SC, q 2–4 h

嚴重疼痛或緊迫時，合併不同種類止痛藥比只用單一藥物效果更佳，例如合併使用鴉片類藥物與非類固醇類消炎藥：Buprenorphine\* + Ketoprofen #或 Buprenorphine\* + Meloxicam#。

3. 倉鼠、沙鼠與天竺鼠最常用的止痛藥 Buprenorphine 0.01-0.05mg/kg, SC, q 8 h。

#### 4. 兔子

輕度疼痛或緊迫 (對應疼痛等級D1)	中度疼痛或緊迫 (對應疼痛等級D1、D2)	重度疼痛或緊迫 (對應疼痛等級D2、E)
局部麻醉劑 Lidocaine/ Bupivacaine	局部麻醉劑 Bupivacaine (與全身性止痛合併使用)	局部麻醉劑 Bupivacaine (與全身性止痛合併使用)
Ketoprofen 3 mg/kg, SC, once	Buprenorphine 0.01-0.05 mg/kg, SC,IM,IV, q 6–12 h	Buprenorphine 0.05 mg/kg, SC,IM,IV, q 6–12 h
Butorphanol 0.1-0.5 mg/kg, IM,IV, q 4 h	Butorphanol 0.1-0.5 mg/kg, IM,IV, q 4 h	Morphine 2–5 mg/kg, SC, q 2–4 h
Carprofen 4.0 mg/kg, SC, 1.5 mg/kg, PO, once	Carprofen 4.0 mg/kg, SC, q 24 h 1.5 mg/kg, PO, q 12 h	Fentanyl patch 25 $\mu$ g/h Transdermal q 72 h
Meloxicam 0.2-0.3 mg/kg, SC, PO, once	Meloxicam 0.3–1.5 mg/kg, PO, q 24 h	

(參考文獻：Dennis F Kohn et al. (2007) Guidelines for the Assessment and Management of Pain in Rodents and Rabbits. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science Vol 46, No 2, 97–108)

## 二、疼痛評估表範例

大小鼠疼痛評估記錄表								
操作內容： IACUC NO:		日期： 動物品系：		執行人員： 動物飼養：		評估日期： 動物性別：♀/♂		
評估項目		分數	動物編號 / 術前體重(克)					
體重	正常	0	/	/	/	/	/	/
	A. 體重減少原體重的10%以下	1						
	B. 體重減少原體重的10-25%	2						
	C. 體重減少原體重的25%以上	4						
外觀	正常，眼睛乾淨 短暫的拱背，或部分毛髮豎起， 或傷口滲漏	0						
	間歇性（10分鐘以內）拱背或異常姿勢，或明顯毛色粗剛，或口鼻分泌物出現，或傷口紅腫發爛	1						
	持續性（超過10分鐘）拱背或異常姿勢，或明顯皮毛粗剛並伴隨其他症狀(如拱背、遲鈍反應及行為)，或傷口持續出血、化膿	2						
	正常	4						
臨床症狀	呼吸異常，短暫的流涎，或震顫	0						
	呼吸異常、間歇性（10分鐘以內）震顫、痙攣，或間歇性的奔瀉下頰附近的皮毛，或沉鬱趴倒（1小時以內）	1						
	呼吸異常、持續性（超過10分鐘）震顫、痙攣，或持續性的奔瀉下頰附近的皮毛，或沉鬱趴倒（超過1小時）	2						
	正常	4						
無刺激時一般行為	正常	0						
	活力輕微下降	1						
	活力明顯下降	2						
	昏睡，或持續走動繞圈，或持續縮眠，或無法行動	4						
對刺激的反應	正常	0						
	輕微出現沉鬱/興奮反應，仍有警覺性	1						
	明顯出現沉鬱/興奮反應，仍有警覺性	2						
	反應過激有攻擊性，或昏迷、對刺激完全沒反應	4						
總分	0-20							
止痛劑給予*	Buprenorphine _____ mg/kg							
	Ketoprofen _____ mg/kg							
	Other: _____ mg/kg							
其他說明								
觀察者	簽名 / 時間							
獸醫師/試驗負責人 判定	簽名 / 時間							
人道撫慰與否								
正常：0~4分								
輕度疼痛：體重A、5~9分：提供止痛藥品，每24小時重新評估動物狀態。								
中度疼痛：體重B、10~14分：提供止痛藥品，每8-12小時重新評估動物狀態，連續3次此區分數，考慮給予安樂死。								
重度疼痛：體重C、15~20分：提供止痛藥品，若4小時內無法緩解動物疼痛，考慮給予安樂死。								